


Αλγόριθμος αντιμετώπισης σοβαρού βαθμού Στένωσης Αορτικής Βαλβίδας

Σοβαρού Βαθμού Στένωση Αορτικής Βαλβίδας



Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο καρδιάς (CABG, Ανιούσης Αορτής, άλλη βαλβίδα)

Ναι

Όχι

Αμφίβολα

Δοκιμασία κόπωσης

Θετική

Αρνητική

Συμπτώματα
Πτώση Αρτηριακής Πίεσης
Κοιλιακές Αρρυθμίες

Κλάσμα εξώθησης ΑΡ κοιλίας

<50%

>50%

Ναι

Όχι

Ασθενής σωματικά δραστήριος

Ναι

Όχι

Θετική

Δοκιμασία κόπωσης

Αρνητική

Χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας

Κλινική παρακολούθηση και έλεγχος με υπερηχοκαρδιογράφημα
κάθε 6 - 12 μήνες ή επί εμφάνισης συμπτωμάτων

ΠΗΓΕΣ

•Κόκκινο χρώμα: 2008 Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2008;52:e1-e142

•Μπλε χρώμα: Guidelines on the management of valvular heart disease. The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* (2007) 28, 230–268

•Πράσινο χρώμα: Κοινές κατευθυντήριες οδηγίες ACC/AHA και ESC.

