

Αντενδείξεις θρομβολυτικής θεραπείας σε Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

Απόλυτες αντενδείξεις

Ιστορικό ενδοκράνιας αιμορραγίας

Γνωστή δομική ανωμαλία εγκεφαλικών αγγείων

Γνωστή κακοήθης ενδοκράνια νεοπλασία (πρωτοπαθής ή μεταστατική)

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τους προηγούμενους 3 μήνες

Υπόνοια αορτικού διαχωρισμού

Ενεργός αιμορραγία ή αιμορραγική διάθεση

Σημαντικό τραύμα κεφαλής κατά τους προηγούμενους 3 μήνες

Σχετικές αντενδείξεις

Ιστορικό χρόνιας, βαρείας υπέρτασης με πτωχή ρύθμιση

ΣΑΠ>180mmHg ή ΔΑΠ>110mmHg κατά την προσέλευση

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από τους τελευταίους 3 μήνες

Τραυματική ή παρατεταμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (>10min)

Μείζον χειρουργείο κατά τις προηγούμενες 3 εβδομάδες

Πρόσφατη εσωτερική αιμορραγία (προηγούμενες 2-4 εβδομάδες)

Για στρεπτοκινάση / ανιστρεπλάση: προηγούμενη χορήγηση (>5 ημέρες) ή γνωστή αλλεργική αντίδραση

Εγκυμοσύνη

Ενεργό πεπτικό έλκος

Λήψη αντιπηκτικών σκευασμάτων

Πηγή:

American Heart Association: ACLS - Stabilization of the Patient With Acute Coronary Syndromes
Circulation (2005), 112, **IV89—IV110**

